# 令和6年産 JA米

# 美味しいあおば米 てんたかくの栽培こよみ

コシヒカリとの組み合せで、気象変動へのリスク回避と作業分散！

あおば農業協同組合
各地区農業技術者協議会

※肥料・農薬名は農協の推奨品目です

## 「てんたかく」栽培のポイント

- 倒伏防止のため、過剰施肥は避ける
- ５月５日頃までに植え、生育量を確保する
- 穂数確保のため、70株/坪植えとする
- 葉色4.0（砂壌土4.2）を下回らないようにする
- 紋枯病の発生が見られる場合は随時防除を行う
- 斑点米防止のため、穂揃期と傾穂期の基本防除を徹底する
- カメムシ常発地、多発時については随時防除を行う

## 収量構成要素

| 構成要素 | 目標値 |
|---|---|
| 10a当たり収量 | 600kg |
| ㎡当たり穂数 | 500本 |
| 一穂籾数 | 60粒 |
| ㎡当たり籾数 | 30,000粒 |
| 登熟歩合 | 85% |
| 玄米千粒重 | 23.5ｇ |

## 基肥一発施肥量の目安（エコ早生専用）

| 土壌区分 | | 施用量(kg/10a) |
|---|---|---|
| 沖積 | 砂壌土 | 37～42 |
| | 壌土 | 32～37 |
| | 埴壌土 | 30～35 |
| 洪積 | 赤土 | 32～37 |
| | 黒ボク | 37～42 |

## 病害虫防除体系

| | 対象病害虫 | 時期 | 農薬名 | 散布量(/10a) |
|---|---|---|---|---|
| 本田防除 | カメムシ類<br>ウンカ類<br>いもち病 | 穂揃期 | ビームスタークル粉剤5ＤＬ | 4kg |
| | | | ビームエイトスタークルゾル（1000倍液） | 100～150L |
| | カメムシ類<br>ウンカ類 | 傾穂期 | キラップ粉剤ＤＬ | 4kg |
| | | | キラップフロアブル（1000倍液） | 100～150L |
| 随時 | 紋枯病 | 穂ばらみ期 | モンカットファイン粉剤２０ＤＬ | 4kg |
| | | | バシタックゾル（1000倍液） | 100～150L |
| | カメムシ類<br>ウンカ類 | 8月上中旬頃 | スタークル粉剤ＤＬ　※1 | 3kg |
| | | | スタークル液剤10（1000倍液）※1<br>又は　トレボン乳剤（2000倍液）※2 | 100～150L |

※1 但し収穫の７日前まで　　※2 但し収穫の１４日前まで

## 植付けの目安

| | |
|---|---|
| 株数 | 70株 |
| 本数 | 3～4本 |
| 深さ | 3cm程度 |




| 月　日 | 4　月 | 5　月 | 6　月 6/28頃 | 7　月 7/18頃 | 8　月 8/22頃 | 9　月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水管理 | やや深水 | 浅水管理 | 中干しの徹底　間断かん水 | 手溝の水が切れないように管理する（飽水管理） | 湛水管理　間断かん水 | 落水を急がない |
| 生育期 | 育苗期 | 活着期 | 有効分げつ期 | 無効分げつ期 | 幼穂形成期 | 穂ばらみ期 |
| 管理のポイント | ●土づくり資材の施用と深耕<br>●播種（低温時の保温に注意）<br>（1箱当たり乾籾120ｇ）<br>●健苗育成<br>●基肥量は基準量を厳守<br>●紋枯病剤を含む苗箱施薬の実施<br>●田植えは5月5日頃までに終える | ●田植直後はやや深水として活着を早める<br>●活着後は3㎝程度の浅水管理 | ●昼間止め水、朝夕短時間入水<br>●早めの溝掘り<br>●中干し開始<br>（田植後1ヶ月までに開始） | ●中干し後は間断かん水を徹底 | ●一発肥料でも葉色が淡ければ直ちに追肥<br>●幼穂形成期の葉色は4.0<br>（砂壌土4.2）を下回らせない<br>●幼穂形成期以降は飽水管理<br>●畦畔・農道等の草刈りを徹底 | ●紋枯病の随時防除 |

| 生育期 | 登熟期 | 収穫期 |
|---|---|---|
| 管理のポイント | ●穂揃期の葉色を4.2に誘導<br>●基本防除1回目（穂揃期）<br>防除は7日間隔で10日以上あけない<br>●基本防除2回目（傾穂期）<br>●随時防除（カメムシ常発地・多発時）<br>●フェーン時には事前にかん水<br>●刈取5～7日前まで間断かん水<br>（刈取時期に合わせて落水）<br>●籾の黄化率85～90％での適期刈取<br>（刈遅れによる胴割米の発生防止） | ●目標仕上げ水分14.5～15.0％<br>●1.9㎜のふるい目で選別する |

出穂後の湛水管理に備え田面を固める

中干し、間断かん水により、しっかりと根づくりを行う

カメムシ防除には穂揃期と傾穂期の殺虫剤散布が不可欠です。

播種～育苗に係る農薬は移植コシヒカリと同一です

出穂後20日間は十分な湛水状態を保つ

## 栽培記録

| 区分 | 珪酸質資材、肥料名 | 散布月日 | 施用量 |
|---|---|---|---|
| 土づくり | | 月　日 | kg/10a |
| | | 月　日 | kg/10a |
| | | 月　日 | kg/10a |
| 施肥 | 基肥 | 月　日 | kg/10a |
| | 追肥 | 月　日 | kg/10a |
| | 穂肥① | 月　日 | kg/10a |
| | 穂肥② | 月　日 | kg/10a |

| 本田管理 | | | |
|---|---|---|---|
| 耕起 | 月　日～　月　日 | 代かき | 月　日～　月　日 |
| 中干し | 月　日～　月　日 | 落水 | 月　日～　月　日 |
| 田植え | 月　日～　月　日 | 刈取日 | 月　日～　月　日 |

| 区分 | 農薬名 | 散布月日 | 散布量 |
|---|---|---|---|
| 除草 | | 月　日 | /10a |
| | | 月　日 | /10a |
| | | 月　日 | /10a |

| 区分 | 時期 | 農薬名 | 散布月日 | 散布量 |
|---|---|---|---|---|
| 病害虫防除 | 育苗期　種子消毒 | | 月　日 | mℓ/ 箱 |
| | 育苗期 | | 月　日 | |
| | 苗箱施薬 | | 月　日 | 50g/ 箱 |
| | 本田 | | 月　日 | /10a |
| | 本田 | | 月　日 | /10a |
| | 本田 | | 月　日 | /10a |
| | 随時 | | 月　日 | /10a |