

水稻情報報

(第1号)

令和2年3月25日
あおば農業協同組合
各地区農業技術者協議会

～～ 目指せ！あおば米1等米比率90%以上！！～～

- ・コシヒカリの田植えは5月15日を中心に、育苗日数は20日間以内を目安に計画的に播種しましょう。
- ・硬化期の換気を徹底し、健苗育成に努めましょう。

コシヒカリの8月5日頃出穂を目指したスケジュール（平坦地）

浸種	播種	田植え日	出穂期
4/8	4/19	5/10	8/1頃
4/16	4/25	5/15	8/5頃
4/24	5/2	5/20	8/7頃

○播種から田植までを20日間以内としましょう！
○健苗移植で初期生育も良好に！



出穂後の高温を
回避すれば、
基白・背白粒の
発生が減少！



☆★☆育苗のスケジュールと作業内容☆★☆

田植予定日	作業	温度管理	作業管理のポイント												
5/15															
4/15	①比重選 ②種子消毒	水温は 10~20°C を確保	<p>①比重選により、充実した種糲を準備する！ *発芽障害を防ぐため、選別後硫安を水で洗い流す。</p> <p>②種子消毒の徹底！ 【薬液の作り方】薬液は1回ごとに新しく作り換えて浸漬する！</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名</th> <th>希釈倍率</th> <th>浸漬時間</th> <th>種糲量</th> <th>水量</th> <th>薬剤量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>モミガードC水和剤</td> <td>200倍</td> <td>24時間</td> <td>10kg</td> <td>20ℓ</td> <td>100g</td> </tr> </tbody> </table> <p>種子消毒後の廃液は適切に処理し、用水、河川に流出しないよう気をつける。</p>	薬剤名	希釈倍率	浸漬時間	種糲量	水量	薬剤量	モミガードC水和剤	200倍	24時間	10kg	20ℓ	100g
薬剤名	希釈倍率	浸漬時間	種糲量	水量	薬剤量										
モミガードC水和剤	200倍	24時間	10kg	20ℓ	100g										
4/16	③浸種	浸種期間の目安 10°C→10日間 15°C→7日間	<p>③浸種は、4月8日以降から始める（基本）！ ・水温×日数=積算温度100°Cを確保する。 ・水は浸種後2~3日目に交換、次からは1~2日おきに交換する。 ・発芽揃いを良くするため、浸種開始日は水温12~13°Cとする。</p>												
4/24	④催芽	育苗器内温度 28~30°C 20~24時間	<p>④芽の長さをこまめにチェック！ ・芽揃いを良くするため1日2~3回、袋を反転させる。</p>												
4/25	⑤播種		<p>⑤播種量は催芽糲で箱当たり150g（乾糲120g） ・均一に播種するため、糲の水切り（脱水）は十分に行う。 (糲が手に付かない程度にまで陰干しを行う。)</p> <table border="1"> <tr> <td>乾糲 120g 播き</td> <td>○</td> <td>乾糲 140g 播き</td> <td>×</td> </tr> </table> <p>【苗立枯病対策】 (播種時のかん水を兼ねる。) ナエファインプロアブル1000倍液を 1箱当り500ml灌注。</p>	乾糲 120g 播き	○	乾糲 140g 播き	×								
乾糲 120g 播き	○	乾糲 140g 播き	×												
4/28	⑥出芽 ⑦搬出 緑化	育苗器内温度 30°C 2~3日 ハウス内温度 昼:25°C以下 夜:10°C以上	<p>⑥出芽</p> <p>⑦芽の長さが1cmに揃ったら搬出！ ・搬出後は、覆土を落ち着かせ、緑化中に水不足にならない程度にかん水。 ・緑化期間中でも、ハウスの温度が25°Cを超えないよう換気を行う。 ・第1葉が展開したら速やかに被覆資材を外す。</p> <p>晴天日にハウスを閉めっぱなしにすると、ハウス内温度が40°Cを超える。「晴れ」が予想される日は、朝から換気しましょう。</p>												
4/30	⑧硬化	ハウス内温度 昼:25°C以下 夜:10°C以上	<p>⑧田植えの7~10日前からは、昼夜ともに換気し、十分外気に慣らす！ ・かん水は朝にたっぷりと行き、日中は床土の乾きに応じて行う。 ・かん水过多は根張りが悪くなるので、水持ちの良い床土はやり過ぎにも注意。</p>												
5/15	田植														

GAP チェックシート・栽培履歴の提出に備えて「栽培こよみ」に作業月日を記入してください。

春の土づくり

★★★1等米比率の向上は確実な土づくりが基本★★★

1 土壤改良資材の施用

～ 土壤調査の結果、以前よりケイ酸や腐植含量(有機物等)が低下しています！！～

- ケイ酸は高温条件下で堆肥を向上させ、整粒歩合が高くなります(図1)。
- 成熟期の茎葉ケイ酸濃度が高いと、割糲が少なくなり、カメムシ斑点米の被害も抑制します(図2)。
 - ・令和2年産に向けて、積極的に継続散布をお願いします！




図1 成熟期の茎葉のケイ酸濃度と整粒歩合の関係




図2 稲体のケイ酸濃度と割糲の関係

カメムシは割糲の隙間から玄米を吸います！



◎ケイ酸+アルカリ資材の継続施用

継続施用でケイ酸は品質向上に、アルカリ成分を含む資材はpH矯正に役立ちます。

※JAあおばでは、ケイ酸質資材等の購入代金に対して1%の助成を行っています。

【ケイ酸+アルカリ質資材の標準施用量】(kg/10a)

資材名	施用量
あおばスーパーケイサン+	90
あおばフミンエース	100
シリカロマン	100
灰入りスーパーEスアイ加里	100
有機加里入りシリカロマン	100

2 有機物の施用

～ 有機物の施用であおば米の食味向上！！～

- 堆肥や発酵鶏糞などの有機物を積極的に施用し、地力の向上に努めましょう。

※JAあおばから堆肥散布に対する助成もあります。翌年1月までに申請が必要です。詳細については、各地区営農経済センターまでお問い合わせください。

【堆肥施用量の目安】春施用:10a当たり

牛糞堆肥	1トン
豚糞堆肥	0.5~1トン
発酵鶏糞	75kg(復元田:150kg)

注:コシヒカリは、基肥を窒素成分で1kg減肥

3 深耕による作土層の拡大

作土深15cm以上を確保するためトラクターの速度を落とし、現状+3cmの深耕を心掛けましょう。

カメムシ対策 第1回

～ 春から始まる雑草対策 ～

- ・カメムシが好むイネ科雑草を春のうちに少なくすることで、カメムシの密度を抑えることができます。
- ・除草剤を使用する場合は、4月中下旬頃を目途に畦畔等にバスタ液剤、ザクサ液剤等の茎葉処理除草剤を散布して雑草を減らすようにしましょう(遅くとも田植えの始まる前までに行いましょう)。
- ・除草剤散布をしない場合は、幼虫の餌となるイネ科雑草が穂をつけないよう、こまめに草刈りを行いましょう。



除草方法	越冬世代に対する密度低減効果		除草により期待される効果等
	幼虫	成虫	
除草剤散布 (バスタ、ザクサ等)	○	○	<ul style="list-style-type: none">・カメムシ類の密度低減効果が高い。・幼虫の餌となるイネ科雑草がなく、生存できなくなる。・寄主植物がないため、成虫の飛来や産卵がみられなくなる。
草刈り (穂が出ないように)	△	○	<ul style="list-style-type: none">・除草剤散布ができない場合の対応・幼虫はイネ科雑草の葉だけでも発育できるが、穂がないため、幼虫の発育遅延や羽化率が低下する。・穂がないため、成虫の飛来や産卵が抑えられる。

注) ○:効果が高い、△:一定の効果がある

【水稻育苗ハウスで野菜等の栽培を行われる方へ】

- 水稻育苗ハウスで野菜等の栽培を行う場合、苗箱施薬剤は育苗ハウスから搬出した後に散布しましょう！

春の農作業安全運動展開中！「見直そう！農業機械作業の安全対策！！」

水稻情報 第2号の発行日は、4月24日(予定)です。